

Tabla 18. *Picridio riellii*-*Stipetum calamagrostidis* O. Bolòs 1960 *ligusticetosum lucidi* (Fdez. Casas) Benito 2004 (Invs. 1-14), *typicum* (Inv. 15-22) y *convolvuletosum arvensis* (Fdez. Casas) Benito 2004 (Inv. 23)

Inventario	Nº de orden	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]	
	Altitud (m)	1350	1400	1625	1625	1380	1745	1550	1570	1800	1750	1650	1500	1100	1220	950	1058	1250	1465	1185	1005	1670-	1700		
Orientación																							E	S	
Inclinación (%)																							45	520	
Cobertura total (%)																									
Área (m ²)																									
Características de asociación y unidades superiores																									
<i>Rumex scutatus</i>	+	x	1,1	1,1																					
<i>Stipa calamagrostis</i>	3	x	+2																						
<i>Silene vulgaris</i>	1	x	+																						
<i>Galeopsis tetrahitum</i>	1	x																							
<i>Psychois saxifraga</i>		x																							
<i>Veronica nummularia</i>																									
<i>Campanula cochlearifolia</i>																									
<i>Galium cespitosum</i>																									
Diferenciales de subasociación																									
<i>Crepis pygmaea</i>	+	x	+	+	+	+	+	+	+	1,2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	V	
<i>Pygmaea</i>																									
<i>Ligusticum lucidum</i>																									
<i>lucidum</i>																									
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	1	x	1,1	+																					
<i>intermedium</i>																									
<i>Campanula speciosa</i>	+	x	+																						
<i>speciosa</i>																									
<i>Scrophularia canina</i>																									
<i>crithmifolia</i>																									
<i>Thalictrum minus minus</i>																									
<i>Borderea pyrenaica</i>	+	x	+	+	+	+	+	+	+																
<i>Rhamnus alpina alpina</i>																									
<i>Linaria alpina alpina</i>																									
<i>Erodium glandulosum</i>																									
<i>Convolvulus arvensis</i>																									
<i>Chenopodium minus</i>																									

Acompañantes

	Nº de orden	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]
<i>Sedum album</i>																								
<i>Festuca gautieri</i>		+3	2.2	+																				
<i>Scoparia</i>		1.1	+																					
<i>Helieborus foetidus</i>																								
<i>Asperula cynanchica</i>																								
<i>brachysiphon</i>																								
<i>Eruca sativa</i>																								
<i>Erinus alpinus</i>																								
<i>Teucrium chamaedrys</i>																								
<i>Aquilegia vulgaris</i>																								
<i>Eiscurella gl. laevigata</i>																								
<i>Galium lucidum</i> s.l.		x																						
<i>Geranium robertianum</i>		x																						
<i>Galium pumilum</i>																								
<i>Thymus vulgaris</i>																								
<i>Satureja montana</i>																								
<i>montana</i>																								
<i>Arenaria grandiflora</i>																								
<i>grandiflora</i>																								
<i>Sedum album</i>																								

Características presentes en un inventario: *Gymnocarpium robertianum* en 20(+2).

Acompañantes presentes en **menos de tres inventarios**: *Acer opalus opalus* en 20; *Acinos alpinus* en 20; *Actaea spicata* en 19; *Anemone nemorosa* en 19; *Arabis turrita* en 16; *Anthennaria elatius* en 5 y 19(+2); *Asplenium trichomanes* en 2(X); *Bartsia repanda* en 11; *Brassica angulosa* en 11; *Buxus sempervirens* en 18; *Campanula glomerata* en 20; *C. rotundifolia* en 20 y 21(+2); *Carduus caninus* en 11; *Calluna acutifolia* en 5 y 23(V); *Corolla emerus* en 17; *Corylus avellana* en 19; *Cypripedium acaule* en 16(+2); *Dianthus hyssopifolius* en 15; *Echinops sphaerocarpus* en 21(+2); *Echium vulgare* en 10; *Elymus caninus* en 16; *Euphorbia corollata* en 2(Y); *Euphrasia cyprinensis* en 13 y 22(V); *Euphrasia salisburiana* en 21; *Gaultheria procumbens* en 21; *Globalia nudicaulis* en 11; *Gypsothila repens* en 18; *Helictochiton sedentarius* en 4(12) y 10(1,2); *Hieracium candidum* en 5; *Iberis ciliata* en 5; *Iris latifolia* en 11; *Kernera saxatilis* en 11; *Lathyrus vernus* en 19; *Linaria minor* en 19; *Linaria nigra* en 5; *Luzula sylvatica* en 5 y 6; *Lunaria viscosum* en 15; *Melica ciliata* en 16(Y) y 19; *Moehringia vallesiana* en 20; *Onobrychis viciifolia* en 14; *Orobanchaceae* en 10; *Petasites paradoxus* en 14(+2); *Polygonum perfoliatum* en 11(+2); *Pulseatilla alpina fontqueri* en 11; *Reseda glauca* en 11 y 21(+2); *Rubus idaeus* en 20; *Saponaria ocymoides* en 15 y 18; *Scutellaria alpina alpina* en 4 y 13; *Sedum achimiioides* en 11(+2); *Staphylinus desmodioides* en 16; *S. sediforme* en 19; *Sesleria albicans* en 51(3); *Sideritis hyssopifolia* en 11(+3) y 23(V); *Solidago virgaurea* en 11; *Sordidula aucuparia* aucuparia en 20; *Thymelaea tincta* nivea en 23(IV); *Vicia pyrenaica* en 2(X).

Localidades de la tabla 18:

- [P00759]; P. Bielsa, por encima del Parador, BH62, (FERNÁNDEZ CASAS, 1970: 280), ut
 - [P00758]; P. Bielsa, por encima del Parador, BH62, (FERNÁNDEZ CASAS, 1970: 280), ut
 - [P00759]; P. Bielsa, por encima del Parador, BH62, (FERNÁNDEZ CASAS, 1970: 280), ut
 - [P010233]; P. Bielsa, La Larrí, BH6130, 14-VI-1996, JLB, 1405961D
 - [P010234]; P. Bielsa, La Larrí, BH6130, 14-VI-1996, JLB, 1406961E
 - [P010239]; B. Tora, bco. del Gábelo, YN3731, 22-VII-1997, JLB, 220797D
 - [P010219]; B. Tora, bco. del Gábelo, YN3731, 22-VII-1997, JLB, 220797E
 - [P010580]; O. Tora, Faja Racón, Rincón de Cotatuero, YNA227, 16-VII-1997, JLB, 160797B
 - [P010291]; P. Bielsa, solana de Espierba, BH6328, 5-VI-1993, 050793B
 - [P010575]; P. Bielsa, Estiva de Espierba, BH6328, 13-VI-1996, JLB, 1306961L
 - [P010581]; O. Tora, Faja Racón, Rincón de Cotatuero, YN4227, 16-VII-1997, JLB, 160797C
 - [P010582]; P. Bielsa, camino al Balcon de Pineta, BH6930, 28-VIII-1997, JLB, 240897H
 - [P10574]; P. Bielsa, Estiva de Espierba, BH6328, 13-VI-1996, JLB, 130696K
- 13 [P0213]; P. Bielsa, La Larrí, BH6130, 14-VI-1996, JLB, 140696F
- 14 [P0289]; CH, Bielsa, valle de Chisqués, BH6626, 22-VI-1996, JLB, 260966D
- 15 [P00693]; O. Tora, puente de los Navarros, YN3726, (RIVAS MARTÍNEZ, 1977: 21)
- 16 [P00692]; O. Tora, valle de Oriñesa, YN42, (RIVAS MARTÍNEZ, 1977: 21)
- 17 [P00691]; A. Fanlo, valle de Arísico, 2BH51, (RIVAS MARTÍNEZ, 1977: 21)
- 18 [P00690]; A. Fanlo, valle de Arísico, 2BH51, (RIVAS MARTÍNEZ, 1977: 21)
- 19 [P01577]; B. Tora, bco. l'Antica, YN3627, 8-IX-1996, JLB, 80986E
- 20 [P0579]; O. Tora, Senda de Cazadores, YN4125, 12-X-1996, JLB, 121096C
- 21 [P0576]; B. Tora, bco. de San Bastán, YN3727, 8-IX-1996, JLB, 080986B
- 22 [P0583]; A. Fanlo, camino del Pontello (Sérue) a Anisclo, BH5817, 5-VII-1997, JLB & Goñi, 050797E
- 23 [P00731]; A. Fanlo, proximidades de Cueto Arenas, BH52, (FERNÁNDEZ CASAS, 1970: 116), resumen de 3 inventarios del *Crepidetum pygmaeum convolvolutosum*