

Tabla 54. *Oxytropido foucaudii-Elynetum myosuroidis* Chouard 1943 *plantaginetosum mediae* Arbella, Benito & Aldezábal *subass. nova*

| Inventario | P00437 | P00439 | P00444 | P00436 | P00438 | P00442 | P00435 | P00443 | P00434 | P00441 | P00445 | P00445 | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| N.º de orden | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [Sin] |
| Altitud (m) | 2120 | 2130 | 2120 | 2070 | 2140 | 2080 | 2070 | 2110 | 2080 | 2150 | 1840 | 2090 | |
| Orientación | SO | ESE | SE | SE | SSE | SO | S | - | E | SSE | ENE | NNE | |
| Inclinación (º) | 10 | 5 | 30 | 5 | 20 | 25 | 5 | 0 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
| Cobertura total (%) | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | |
| Área (m²) | 20 | 15 | 25 | 30 | 10 | 50 | 15 | 30 | 25 | 20 | 100 | 40 | |
| Características de asociación y alianza (<i>Elynnion</i>) | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kobresia myosuroides</i> | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | V |
| <i>Polygonum viviparum</i> | 2 | 2 | 1 | . | 2 | 2 | 1 | 2 | + | 2 | 1 | 1 | V |
| <i>Poa alpina</i> var. <i>alpina</i> | . | + | + | 1 | + | + | + | 1 | + | + | + | 1 | V |
| <i>Astragalus alpinus</i> | . | + | . | . | . | . | . | . | + | + | . | + | II |
| <i>Oxytropis neglecta</i> | . | . | . | + | + | + | . | . | + | 1 | . | + | II |
| <i>Silene acaulis</i> | . | . | . | . | . | + | . | . | + | . | + | . | II |
| Especies de la clase Festuco-Brometea, diferenciales de subasociación | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Plantago media</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | + | + | 1 | . | . | IV |
| <i>Briza media</i> | + | . | + | . | + | + | + | + | + | 1 | 1 | . | IV |
| <i>Trifolium montanum</i> <i>montanum</i> | . | . | + | . | + | + | + | 1 | + | . | + | + | IV |
| <i>Leontodon hispidus hispidus</i> | 1 | + | + | + | + | + | . | . | . | + | + | + | IV |
| <i>Sanguisorba minor minor</i> | 1 | + | + | + | + | + | + | . | . | . | 1 | . | III |
| <i>Hippocratea comosa</i> | + | + | . | . | . | + | . | + | + | 1 | . | . | III |
| <i>Carex caryophyllea</i> | . | + | . | . | + | + | + | + | + | 1 | . | . | III |
| <i>Helianthemum nummularium</i> | + | . | . | . | 2 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | II |
| <i>Phyteuma orbiculare</i> | . | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | = |
| <i>Cirsium acaule acaule</i> | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| Características de orden (Seslerietea) y clase (Elyno-Seslerietea) | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Anthyllis vulneraria alpestris</i> | + | 1 | 1 | + | + | + | + | 1 | + | + | + | + | V |
| <i>Sesleria albicans</i> | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | V |
| <i>Carex ornithopoda</i> | + | + | 1 | . | + | + | + | 1 | + | + | . | . | IV |
| <i>Carduus carlinifolius</i> <i>carlinifolius</i> | + | + | + | + | + | + | . | + | + | + | . | . | IV |
| <i>Lotus corniculatus alpinus</i> | . | + | . | + | + | + | + | + | + | 1 | + | . | IV |
| <i>Medicago suffruticosa</i> | + | . | + | . | . | + | + | + | + | . | . | . | III |
| <i>Androsace villosa</i> | + | . | + | . | + | + | + | + | + | + | . | + | IV |
| <i>Erigeron alpinus</i> | + | . | + | + | + | + | + | . | + | + | . | + | III |
| <i>Gentiana verna verna</i> | + | . | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | III |
| <i>Carex sempervirens</i> | + | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | III |
| <i>Helictotrichon sedenense</i> | . | + | . | . | . | + | 1 | + | . | . | + | . | III |
| <i>Pulsatilla alpina font-queri</i> | . | + | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | II |
| <i>Vicia pyrenaica</i> | . | . | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | II |
| <i>Geranium cinereum</i> <i>cinerereum</i> | . | . | + | . | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 1 | II |
| <i>Ranunculus gouanii</i> | . | . | . | . | . | . | + | + | + | . | . | . | II |
| <i>Potentilla crantzii</i> | . | . | . | . | . | . | + | + | + | . | + | . | = |
| <i>Festuca gautieri scoparia</i> | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | + | . | - |
| <i>Acinos alpinus</i> | . | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | + | - |
| <i>Thymelaea tinctoria nivalis</i> | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | + | - |
| <i>Koeleria vallesiana</i> <i>vallesiana</i> | . | . | + | . | . | . | . | . | . | . | + | . | I |
| Acompañantes | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Festuca nigrescens</i> | 2 | + | 2 | 3 | 2 | 2 | + | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | V |
| <i>Hieracium pilosella</i> | 1 | . | + | + | + | + | + | 1 | + | + | . | . | IV |
| <i>Merendera montana</i> | 1 | . | + | 1 | + | + | . | + | + | + | . | . | IV |
| <i>Plantago alpina</i> | + | . | . | 1 | . | + | + | 1 | . | + | . | + | III |
| <i>Galium pumilum</i> | + | . | . | 1 | . | + | + | + | . | . | . | . | III |
| <i>Trifolium pratense pratense</i> | . | + | + | . | . | . | + | + | . | . | 1 | . | III |
| <i>Taraxacum gr. dissectum</i> | . | . | + | + | . | + | + | + | . | . | . | . | II |
| <i>Hieracium lactucella</i> | . | . | + | + | . | . | . | . | . | + | . | . | II |
| <i>Plantago monosperma</i> <i>monosperma</i> | . | + | . | . | . | . | . | . | + | . | . | + | II |
| <i>Leontodon pyrenaicus</i> <i>pyrenaicus</i> | . | . | . | . | . | + | + | . | . | + | . | . | II |
| <i>Antennaria dioica</i> | . | . | . | . | . | . | + | + | . | . | . | 1 | II |
| <i>Arenaria moehringioides</i> | . | . | . | . | . | . | + | + | . | . | . | . | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-------|
| <i>Cerastium arvense</i> | . | . | . | . | . | . | + | + | . | . | . | + | II |
| <i>Primula integrifolia</i> | . | . | . | . | . | . | . | . | + | + | . | + | II |
| <i>Crocus vernus albiflorus</i> | + | . | . | . | . | . | . | . | + | . | . | + | I |
| N.º de orden | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [Sin] |

Características de orden (*Seslerietalia*) y clase (*Elyno-Seslerietea*), presentes en un inventario: *Minuartia verna* en 7; *Oxytropis foucaudii* en 12; *Polygala alpestris* en 10; *Ranunculus carinthiacus* en 7; *Thalictrum alpinum* en 9; *Trifolium thalii* en 3.

Características de la clase *Festuco-Brometea*, presentes en un inventario: *Bromus erectus erectus* en 11(1); *Carlina acaulis* en 11; *Prunella grandiflora* en 11; *Agrostis capillaris* en 11; *Alchemilla hybrida colorata* en 7.

Acompañantes presentes en un inventario: *Anthoxanthum odoratum* en 8; *Carex flacca flacca* en 3(1); *Luzula nutans* en 10(1); *Scorzonera aristata* en 10; *Thymus gr. serpyllum* en 1; *Viola rupestris rupestris* en 10.

Localidades de la tabla 54:

- 1 [P00437]: A, Fanlo, barranco Rincón dero Fulco, BH5725, (ARBELLA, 1988: 74)
- 2 [P00439]: A, Fanlo, barranco Rincón dero Fulco, BH5625, (ARBELLA, 1988: 74)
- 3 [P00444]: A, Fanlo, barranco Rincón dero Fulco, BH5625, (ARBELLA, 1988: 74)
- 4 [P00436]: A, Fanlo, barranco Rincón dero Fulco, BH5625, (ARBELLA, 1988: 74)
- 5 [P00438]: A, Fanlo, barranco dero Tito, BH5725, (ARBELLA, 1988: 74)
- 6 [P00442]: A, Fanlo, barranco dero Fulco, BH5725, (ARBELLA, 1988: 74). **Typus**
- 7 [P00435]: A, Fanlo, barranco dero Tito, BH5725, (ARBELLA, 1988: 74)
- 8 [P00443]: A, Fanlo, barranco Rincón dero Fulco, BH5725, (ARBELLA, 1988: 74)
- 9 [P00434]: A, Fanlo, barranco Plana Sotulo, BH5624, (ARBELLA, 1988: 74)
- 10 [P00441]: A, Fanlo, barranco Rincón dero Fulco, BH5725, (ARBELLA, 1988: 74)
- 11 [AA0045]: A, Fanlo, ladera de S. Custodia, sobre la cabecera del bco. de la Capradiza, BH5724, 13-VIII-1991, margas; suelo profundo (40<x<20 cm aprox.), (ALDEZÁBAL, 1997: 571)
- 12 [P00445]: A, Fanlo, barranco A Liana, BH5624, (ARBELLA, 1988: 74)