

Tabla 64. **Roso pendulinae-Fagetum sylvaticae** Rivas-Martínez, Costa & P. Soriano 2002  
**gymnocarpietosum dryopteridis Benito subass. nova (1-4)**  
**typicum (5 y 6), var. de *Abies alba* Benito var. *nova* (6)**

Inventario N.º de orden	PI0321 [1]	PI0324 [2]	PI0322 [3]	PI0325 [4]	PI0554 [5]	P00618 [6]
Altitud (m)	1770	1945	1680	1845	1770	1680
Orientación	ENE	N	NNE	N	N	N
Inclinación (º)	40	40	45	45	45	-
Cobertura arbórea (%)	70	100	40	75	60	-
Cobertura arbustivo (%)	20	10	5	85	20	-
Cobertura herbácea (%)	<5	35	30	10	45	-
Área (m <sup>2</sup> )	140	100	90	100	60	100
Características de asociación, más <i>Vaccinio-Piceetea</i>						
<i>Fagus sylvatica</i>	3.2	5.5	2.2	3.3	3.2	+
<i>Fagus sylvatica</i> (arbust.)	.	.	.	.	1.2	.
<i>Abies alba</i>	3.3	.	+	2.3	2.2	5
<i>Vaccinium myrtillus</i>	+	1.2	1.1	1.1	+	2
<i>Rosa pendulina</i>	+	.	+	+	+	1
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	.	1.3	.	4.3	+.2	+
<i>Sorbus aucuparia aucuparia</i>	.	+	.	+	.	1
<i>Pinus uncinata</i>	.	.	3.2	+	.	.
<i>Pinus x rhaetica</i>	.	.	+	.	.	.
<i>Epipactis atrorubens</i>	.	.	+	.	.	.
<i>Pyrola minor</i>	.	.	.	+	.	.
<i>Melampyrum pratense</i>	.	.	.	+	.	.
<i>Scilla lilio-hyacinthus</i>	.	.	.	.	2.1	.
<i>Festuca altissima</i>	.	.	.	.	1.2	.
<i>Cardamine heptaphylla</i>	.	.	.	.	+	.
<i>Saxifraga umbrosa</i>	.	.	.	.	+	1
<i>Pyrola chlorantha</i>	.	.	.	.	.	1
Diferenciales de subasociación <i>gymnocarpietosum</i>						
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	1.3	2.2	1.3	+	.	.
<i>Pyrola secunda</i>	+.2	.	+	+.2	.	.
<i>Galium rotundifolium</i>	+	.	+	.	.	.
<i>Monotropa hypopitys</i>	(+)	.	.	.	.	.
Características de Fagetales						
<i>Prenanthes purpurea</i>	+	+	+	+	+	1
<i>Luzula nivea</i>	+	(+)	+.2	+	+.2	2
<i>Ranunculus serpens</i>	+	.	+	+	+	.
<i>Melica uniflora</i>	1.1	+	.	+	+	.
<i>Paris quadrifolia</i>	.	(+)	.	.	1.1	.
<i>Hordelymus europaeus</i>	.	.	.	1.2	.	.
<i>Lonicera alpigena alpigena</i>	.	.	.	.	+	+
<i>Luzula sylvatica sylvatica</i>	+	.	.	.	.	1
<i>Lonicera nigra</i>	.	.	.	.	+	.
<i>Veronica urticifolia</i>	.	.	.	.	+	.
Características de Querco-Fagetea						
<i>Hepatica nobilis</i>	1.1	1.1	1.1	1.1	+	+
<i>Viola sylvestris sylvestris</i>	+	1.2	+	+	.	+
<i>Daphne laureola</i>	+.2	1.2	1.3	1.2	1.3	.
<i>Polystichum aculeatum</i>	1.1	1.1	+	1.2	1.1	.
<i>Convalaria majalis</i>	.	+	.	+	+	+
<i>Carex digitata</i>	+	.	.	.	+	+
<i>Polygonatum verticillatum</i>	(+)	.	+	.	+	.
Acompañantes						
<i>Oxalis acetosella</i>	+	+	1.1	+	+	1
<i>Allium victorialis</i>	.	+	+	.	+	.
<i>Deschampsia flexuosa flexuosa</i>	.	.	+.2	.	+	+
<i>Hylocomium splendens</i>	.	.	+.3	+.2	.	.

**Características de Querco-Fagetea:** *Aquilegia vulgaris vulgaris* en 3 y 6; *Amelanchier ovalis* en 3; *Brachypodium sylvaticum sylvaticum* en 4; *Dryopteris filix-mas* en 3(1.2) y 1; 5(1); *Lilium martagon* en 5, 6; *Poa nemoralis nemoralis* en 2; *Populus tremula* en 3; *Pseudoscleropodium purum* en 3(+.2) y 4(+.2); *Solidago virgaurea* en 5; *Sorbus aria* en 3; *Viola sylvestris sylvestris* en 6.

**Acompañantes:** *Agrostis capillaris* en 3; *Alchemilla alpina* en 3 y 4; *Asplenium viride* en 1; *Calamagrostis arundinacea* en 6(1); *Dicranum scoparium* en 3(+.3) y 4(+.3); *Galium pumilum* en 4; *Hieracium murorum* en 3; *Hylocomium splendens* en 3 y 4; *Juniperus communis* en 3; *Laserpitium latifolium latifolium* en 2; *Laserpitium nestleri flabellatum* en 6; *Lathyrus linifolius montanus* en 3(+); *Rubus idaeus* en 3 y 6; *Rubus saxatilis* en 5; *Valeriana montana* en 6; *Veratrum album* en 1 y 6; *Veronica officinalis* en 3 y 4.

**Localidades de la tabla:**

1 [PI0321]: O, Torla, Faja Pelay W, YN3925, 3-VIII-1993, JLB, 030893E. **Typus**

2 [PI0324]: O, Torla, Faja Pelay W, YN4125, 3-VIII-1993, JLB, 030893B

3 [PI0322]: O, Torla, Faja Pelay W, YN3825, 3-VIII-1993, JLB, 030893F

4 [PI0325]: O, Torla, Faja Pelay W, YN4025, 3-VIII-1993, JLB, 030893C

5 [PI0554]: O, Torla, Senda de Cazadores, YN4125, 8-VIII-1993, JLB, 050893D

6 [P00618]: O, Torla, Senda de Cazadores, YN4125, (RIVAS MARTÍNEZ,

1991b: 206)