

Tabla 67. Buxo sempervirens-Fagetum sylvaticae var. de *Daphne laureola* Benito var. *nova*

Inventario	PI0186	PI0326	PI0310	PI0305	BI0430	PI0184	BI0373	PI0314	PI0181
N.º de orden	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
Altitud (m)	1150	1400	1850	1185	1270	1260	1390	1425	1400
Orientación	SE	SW	NNW	NNW	SW	NNW	N	SW	N
Inclinación (º)	40	25	35	45	35	50	35-40	30	15
Cobertura arbórea (%)	95	90	100	100	100	100	100	100	100
Altura arbórea (m)	18	-	-	20	25-30	20	(16)20-24	16-20	-
Cobertura arbustivo (%)	45	-	20	45	-	70	20	10	50
Altura arbustivo (m)	4	-	-	<3	-	1-5	1,5-4(8)	2-4	-
Cobertura herbáceo (%)	60	-	<5	<5	5	<10	<1	10	<5
Área (m ²)	100	50	50	80	-	70	300	100	80
Características de clase (Querco-Fagetea)									
<i>Fagus sylvatica</i>	5.4	5.3	5.5	5.4	5.2	5.5	5.5	5.5	2.2
<i>Fagus sylvatica</i> (arbust.)	.	-	1.1	1.1	.	1.1	+	1.1	1.1
<i>Buxus sempervirens</i>	3.3	2.2	.	3.2	3.2	4.4	2.2	1.1	2.2
<i>Hepatica nobilis</i>	.	.	+	+	+	+	+	+	1.1
<i>Daphne laureola</i>	2.2	1.3	+	+	+	.	+	.	+.2
<i>Viola sylvestris riviniana</i>	+	+	1.1	+	+
<i>Carex digitata</i>	2.2	+.2	+.2	.	+
<i>Ilex aquifolium</i>	+	.	.	3.1	1.1	.	.	2.1	.
<i>Polystichum aculeatum</i>	.	.	+.2	1.1	.	1.2	+	.	.
<i>Dryopteris filix-mas filix-mas</i>	+	+	+	.	.
<i>Poa nemoralis nemoralis</i>	+.2	.	+.2
<i>Brachypodium sylvaticum sylvaticum</i>	+.2	+.2
<i>Taxus baccata</i>	+	2.2
Acompañantes									
<i>Abies alba</i> (arbust.)	+	.	.	+	+	.	1.1	.	1.1
<i>Asplenium trichomanes</i>	+.2	+.2	.	.	.	+.2	.	.	.
<i>Abies alba</i>	+	2.1	.	4.3
<i>Hedera helix helix</i>	3.2	1.1	.	.	.
<i>Sorbus aucuparia aucuparia</i> (arbust.)	+	+	.	.
<i>Pinus sylvestris</i>	+	1.1	.	.	.

Características de orden (Fagetalia): *Cardamine heptaphylla* en 4; *Fraxinus excelsior* en 7; *Helleborus viridis occidentalis* en 3(2.1); *Moehringia trinervia* en 8; *Ranunculus serpens* en 3; *Festuca altissima* en 4.

Características de clase (Querco-Fagetea): *Aquilegia vulgaris vulgaris* en 3; *Corylus avellana* en 1; *Fragaria vesca* en 1; *Helleborus foetidus* en 6; *Lonicera xylosteum* en 1; *Taxus baccata* en 9(1.2); *Vicia sepium* en 2.

Acompañantes: *Asplenium adiantum-nigrum* en 2(+.2); *Asplenium fontanum fontanum* en 6; *Cystopteris fragilis fragilis* en 3; *Hieracium murorum* en 3; *Oxalis acetosella* en 7; *Polypodium vulgare* en 1; *Ramonda myconi* en 6; *Rubus hirtus* en 1(1.3); *Ruscus aculeatus* en 1.

Localidades:

1 [PI0186]: A, Fanlo, c. bco. La Mirona, Tejo Viejo, BH5819, 26-VII-1997, JLB, 260797C

2 [PI0326]: B, Torla, solana del Turbón, YN3529, 23-VII-1993, JLB, 230793A

3 [PI0310]: O, Torla, Faja Pelay, YN4524, 5-VIII-1993, JLB, 050893C

4 [PI0305]: A, Fanlo, barranco de San Vicenda, BH5822, 13-VII-1993, JLB, 130793B

5 [PI0430]: P, Bielsa, al oeste del parador, BH6029, 21-VII-1993, Vigo, 80% hojarasca.

6 [PI0184]: A, Fanlo, sobre las Bordas de Aso, BH5816, 7-VI-1997, JLB, 070697F

7 [PI0373]: O, Torla, camino de Turieta, YN4126, 20-VII-1992, Carreras, 100% de hojarasca.

8 [PI0314]: P, Bielsa, senda del Parador a La Larri, BH6129, 14-VI-1996, JLB, 140696A

9 [PI0181]: B, Torla, Otal, umbría del Turbón, YN3631, 18-VIII-1993, JLB, 180893A